

**Tablo 1.** Sınıfa göre yaş ve cinsiyet dağılımı

		Preklinik	Klinik	Total	Test değeri; sd; p
		n (%)	n (%)	n (%)	
Cinsiyet	Kadın	92 (%68,1)	100 (%63,3)	192 (%65,5)	$\chi^2$ :0,760; df:1; <sup>1</sup> p: 0,383
	Erkek	43 (%31,9)	58 (%36,7)	101 (%34,5)	
Yaş	Min-Maks	18–24	19–25	18–25	<sup>2</sup> p: 0,000*
	Ortalama $\pm$ SS (medyan)	19,66 $\pm$ 0,97 (20)	21,89 $\pm$ 1,30 (22)	20,86 $\pm$ 1,60 (21)	

<sup>1</sup>Ki kare testi.<sup>2</sup>Mann Whitney U testi.

\*p &lt;0,05. n: öğrenci sayısı SS: standart sapma. SD: serbestlik derecesi.

**Tablo 2.** Temporomandibular rahatsızlık tanılarının cinsiyete, sınıfa ve bruksizme göre değerlendirilmesi

		Disk deplasmanı	Artralji	Miyalji
		n (%)	n (%)	n (%)
Cinsiyet	Kadın	69 (%35,9)	17 (%8,9)	50 (%26)
	Erkek	28 (%27,7)	3 (3%)	13 (%12,9)
	Test değeri; sd; p	$\chi^2$ :2017; sd:1; <sup>1</sup> p:0,156	$\chi^2$ :2737; sd:1; <sup>2</sup> p:0,098	$\chi^2$ :6044; sd:1; <sup>2</sup> p:0,014*
Sınıf	Preklinik	39 (%28,9)	5 (%3,7)	21 (%15,6)
	Klinik	58 (36.7%)	15 (9.5%)	42 (26.6%)
	Test değeri; sd; p	$\chi^2$ :2010; sd:1; <sup>1</sup> p:0,156	$\chi^2$ :2981; sd:1; <sup>2</sup> p:0,084	$\chi^2$ :5244; sd:1; <sup>1</sup> p:0,022*
Bruksizm	Var	41 (%25,6)	4 (%2,5)	0 (%0)
	Yok	56 (%42,1)	16 (%12)	63 (%47,4)
	Test değeri; sd; p	$\chi^2$ :8907; sd:1; <sup>1</sup> p:0,003*	$\chi^2$ :8927; sd:1; <sup>2</sup> p:0,003*	$\chi^2$ :93,763; sd:1; <sup>2</sup> p:0,000*

<sup>1</sup>Ki kare testi.<sup>2</sup>Yates süreklilik düzeltmesi.

\*p &lt;0,05.